

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата <<Клоксобел>>

1. Торговое наименование.

Клоксобел.

2. Международное непатентованное наименование. Клоксациллин (cloxacillin).

3. Регистрационный номер.

7506-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.

Суспензия для интрацистернального введения.

Описание. Маслянистая суспензия от белого до светло-серого цвета.

5. Состав.

В одном шприце (8 г) препарата содержится действующее вещество: клоксациллин (в виде натриевой соли) 250 мг; вспомогательные вещества: кремния диоксид, бутилгидрокситолуол, моноглицериды дистиллированные, парафин жидкий.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Антибактериальные средства. Антибиотики. Пенициллины.

7. Фармакодинамика и механизм действия.

Клоксациллин относится к бета-лактамным антибиотикам, пенициллинам устойчивым к бета-лактамазам.

Активен в отношении грамположительных бактерий — *Staphylococcus aureus* (в т.ч. резистентных к действию бензилпенициллина), *Streptococcus* spp., *Corynebacterium ruogenes* и грамотрицательных — *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus mirabilis*.

Бактерицидное действие клоксациллина основано на ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерий.

Фармакокинетика. Препарат, благодаря структуре наполнителя, после интрацистернального введения быстро распределяется по всей молочной железе, обеспечивая воздействие на патогенные микроорганизмы, активизирует обмен веществ в тканях, улучшает трофику, снижает воспалительную реакцию и отечность тканей вымени, стимулирует процесс регенерации.

Клоксациллин практически не всасывается из молочной железы в органы и ткани организма и сохраняет терапевтические концентрации в течение 24 ч. Выводится, главным образом, в неизменном виде с молоком.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не оказывает раздражающего действия на паренхиму вымени.

8. Показания для применения.

Препарат применяют для лечения коров при мастите в период лактации, вызванном микроорганизмами, чувствительными к клоксациллину.

9. Противопоказания.

Препарат запрещается применять животным с гиперчувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Перед применением препарата, молоко из пораженной четверти вымени выдаивают, сосок обрабатывают антисептическим средством. Наконечник шприца помещают в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в четверть вымени. Извлекают шприц и пальцами пережимают сосок на 1-2 минуты. Проводят легкий массаж соска снизу-вверх для лучшего распределения препарата по молочным протокам.

Препарат вводят интрацистернально по 8 г (содержимое 1 шприца) в пораженную четверть вымени с интервалом 24 часа:

- при субклиническом мастите однократно, при необходимости повторить;
- при клиническом мастите легкой и средней степени тяжести трехкратно, при необходимости продолжить лечение до выздоровления.

При клиническом мастите тяжелой степени рекомендуется применять препарат в комплексе со средствами патогенетической и симптоматической терапии до выздоровления.

В случае низкой температуры окружающей среды перед применением шприц с препаратом следует подогреть на водяной бане до температуры тела животного.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

Симптомы передозировки не выявлены.

13. Беременность и период лактации.

Препарат разрешен к применению беременным и лактирующим животным.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

15. Побочное действие.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не наблюдается.

В случае возникновения аллергических реакций, применение препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается одновременное применение препарата с другими интрацистернальными препаратами.

17. Форма выпуска.

Полимерные шприцы для интрацистернального введения по 8 г.

18. Срок годности.

Срок годности 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя, ранее установленного срока, продукты убоя используют на корм плотоядным животным.

Молоко в пищу людям используют не ранее чем через 72 часа после последнего применения препарата при условии полного клинического выздоровления.

Молоко, полученное от животных в период лечения, из здоровых четвертей вымени, запрещается использовать для пищевых целей, такое молоко может быть использовано для

кормления животных после термической обработки. Молоко из пораженных четвертей вымени подлежит уничтожению после кипячения.

23 Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16. +375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

24 Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16. +375 (212) 617-666, inf6belkarolin.com.

25 Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16. +375 (212) 617-666, infObelkarolin.com.