

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Альбел 100»

1. Торговое наименование.

Альбел 100.

2. Международное непатентованное наименование.

Альбендазол (albendazole).

3. Регистрационный номер.

8586-10-23 БПХ-Ф.

4. Лекарственная форма.

Суспензия для приема внутрь.

Описание. Суспензия от кремового до темно-бежевого цвета. При хранении допускается расслоение, легко исчезающее при взбалтывании.

5. Состав.

1 мл препарата содержит действующее вещество: альбендазол 100 мг; вспомогательные вещества: пропиленгликоль, натрия бензоат, ксантановая камедь, лимонная кислота, полисорбат, натрия пиросульфит, вода очищенная.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Антигельминтные средства.

7. Фармакодинамика и механизм действия.

Альбендазол – антигельминтик группы бензимидазолов. Обладает широким спектром антигельминтного действия и активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод (*Ascaris suis*, *Trichocephalus spp.*, *Capillaria spp.*, *Mullerius spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Chabertia spp.*, *Thelazia spp.*, *Strongyloides spp.*), цестод (*Moniezia spp.*, *Avitellinae spp.*, *Thysaniezia spp.*), а также половозрелых трематод (*Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.*, *Dicrocoelium spp.*), обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

Механизм действия альбендазола, обеспечивающий его антигельминтную активность, связан с избирательным подавлением полимеризации β -тубулина, что ведет к деструкции цитоплазматических микроканалцев клеток кишечного тракта гельминтов; подавляет процессы транспорта и утилизацию глюкозы и тормозит синтез АТФ, блокирует передвижение секреторных гранул и других органелл в мышечных клетках паразитов, нарушая проницаемость клеточных мембран и мышечной иннервации, тем самым, вызывая паралич и гибель паразитов.

Фармакокинетика. Альбендазол плохо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, в неизмененном виде не определяется в плазме крови, т.к. быстро превращается в печени в альбендазола сульфоксид, обладающий антигельминтной активностью. Системный фармакологический эффект альбендазола усиливается в случае приема с кормом с повышенным содержанием жира, C_{max} альбендазола сульфоксида достигается через 8-15 ч у свиней, 11 ч у крупного рогатого скота, 24 часа у мелкого рогатого скота. На 70% связывается с белками плазмы и широко распространяется по организму; обнаруживается в моче, желчи, печени, спинномозговой жидкости, молоке. Альбендазола сульфоксид в печени превращается в альбендазола сульфон (вторичный метаболит) и другие окисленные продукты. Выводится преимущественно с фекалиями, частично с мочой, у лактирующих животных – с молоком.

8. Показания для применения.

Препарат применяют сельскохозяйственным животным (крупному рогатому скоту,

овцам, свиньям, лошадям) при гельминтозах, вызываемых возбудителями, чувствительными к альбендазолу.

9. Противопоказания.

Применение препарата запрещается самкам в первую треть беременности, при остром фасциолезе, а также ослабленным, истощенным и больным инфекционными болезнями животным.

10. Способ применения и дозы.

Животным препарат применяют внутрь однократно, индивидуально (на корень языка или с кормом) или групповым способом с кормом.

Крупному рогатому скоту при:

- мониезиезе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах – в дозе 0,75 мл/10 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола/кг массы тела животного);

- при хроническом фасциолезе, парамфистоматозе, дикроцелиозе – в дозе 1 мл/10 кг массы тела животного (10 мг альбендазола/кг массы тела животного).

Овцам при:

- мониезиезе, тизаниезиезе, авителлинозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах – в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела животного (5 мг альбендазола/кг массы тела животного);

- при хроническом фасциолезе, дикроцелиозе, парамфистоматозе – в дозе 0,75 мл/10 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола/кг массы тела животного).

Свиньям при нематодозах – в дозе 1 мл/10 кг массы тела животного (10 мг альбендазола /кг массы тела животного).

Лошадям при цестодозах и нематодозах – в дозе 0,75 мл/10 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола/кг массы тела животного).

Флакон с препаратом перед применением необходимо взболтать.

Специальной диеты и применение слабительных средств перед применением препарата не требуется.

При групповом способе применения, рассчитанную дозу препарата смешивают с концентрированным кормом (из расчета количества корма на одно животное): для лошадей и крупного рогатого скота – 0,5–1,0 кг; для овец и свиней – 0,15–0,2 кг. Полученную лекарственную смесь засыпают в кормушки на группу 10–100 животных, обеспечив к ним свободный подход.

Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10–15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке у животного может развиваться поражение костного мозга (тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз), поражение печени, сопровождаемое повышением уровня аминотрансфераз. У животного может наблюдаться нарушения аппетита, угнетенное состояние, нарушение координации движения. Проводят симптоматическое лечение, направленное на скорейшее выведение препарата из организма и устранение симптомов передозировки.

13. Беременность и период лактации.

Препарат запрещен к применению в первую треть беременности.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Применение препарата молодняку проводить с осторожностью, под наблюдением ветеринарного врача.

15. Побочное действие.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

В редких случаях после применения препарата возможны аллергические реакции.

В случае возникновения аллергических реакций, применение препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается совместное применение препарата с празиквантелом, дексаметазоном, так как это приводит к повышению концентрации альбендазола в крови животного.

17. Форма выпуска.

Полимерные флаконы по 10; 100; 500 и 1000 мл.

18. Срок годности.

Срок годности 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя, ранее установленного срока, продукты убоя используют на корм плотоядным животным.

Молоко в пищевых целях разрешается использовать не ранее чем через 7 суток после применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, после термической обработки используют для кормления животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16.
+375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16.
+375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16.
+375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 21 от 25.03.2026