

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

Протокол от апреля 2023г л^г2 128

Инструкция по применению ветеринарного препарата «Кокцибел 2,5%»

1 Общие сведения

1.1 Кокцибел 2,5% (Coccibelum 2,5%).

Международное непатентованное наименование: толтразурил.

1.2 Лекарственная форма — раствор для приема внутрь.

1. 3 1 см препарата содержит действующее вещество: толтразурил 25 мг; вспомогательные вещества: триэтаноламин, пропиленгликоль.

1.4 Препарат представляет собой вязкую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

1.5 Препарат выпускают в полимерных флаконах по 10; 100 и 1000 см .

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °с до плюс 25 °с. Хранить в недоступном для детей месте!

1.7 Срок годности — 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применять по истечении срока годности.

1.8 Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

2 Фармакологические свойства

2.1 Толтразурил относится к фармакотерапевтической группе противопротозойных лекарственных средств, производное триазина.

2.2 Толтразурил активен против простейших рода Eimeria, паразитирующих у кур и кроликов.

2.3 Механизм действия толтразурила заключается в нарушении процессов клеточного деления шизонтов и микрогамонтов, за счет ингибирования ряда ферментов, участвующих в синтезе пиримидина и клеточном дыхании.

2.4 После приема внутрь толтразурил медленно всасывается в пищеварительном тракте и оказывает эймериоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 24 часа. В организме толтразурил метаболизируется путем сульфоокисления и гидроксилирования с образованием производных сульфоксида и сульфона. Почти полностью выводится с фекалиями в неизмененном виде и, частично, в форме толтразурилсульфона и толтразурилсульфоксида.

Препарат не препятствует формированию иммунитета к эймериозу.

2.5 Кокцибел 2,5% по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

3 Порядок применения

3.1 Кокцибел 2,5% применяют с лечебно-профилактической целью цыплятамбройлерам, ремонтному молодняку кур и кроликам при эймериозе.

3.2 Препарат применяют групповым способом в следующих дозах:

Препарат применяют с водой для поения в дозе 7 мг толтразурила/кг массы тела, что соответствует:

Птице — 1 см препарата/дм питьевой воды, 48 часов подряд; 3 см препарата/дм питьевой воды по 8 часов 2 дня подряд.

Кроликам — 5 см препарата/дм питьевой воды, 48 часов подряд.

В тяжелых случаях заболевания при необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата при тяжелом течении эймериоза, его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

3.3 В период применения препарата, лечебный раствор должен быть единственным источником питьевой воды.

Лечебный раствор сохраняет свою активность в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

3.4 Запрещается применение препарата ремонтному молодняку птицы за 2 недели до начала яйцекладки, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, беременным и лактирующим крольчихам.

3.5 При применении в соответствии с настоящей инструкцией препарата, побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, применение препарата прекращают.

3.6 При передозировке препарата может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды, потеря массы тела. В случае появления симптомов передозировки применение препарата следует прекратить.

Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

Препарат запрещен к применению птице, чье яйцо используется в пищу людям.

3.7 Убой сельскохозяйственной птицы и кроликов разрешается через 16 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя, до истечения указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в ГУ <<Белорусский государственный ветеринарный центр>> (220005, г. Минск, ул. Красная 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью <<Белкарولين>>, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/31.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных (А.И. Ятусевич, И.П. Захарченко, А.М. Сарока, Ю.А. Бородин) УО <<Витебская

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и специалистом
отдела исследований и