

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Тилозинокар»

1 Общие сведения

1.1 Тилозинокар (Tilozinocarum).

Международное непатентованное наименование: тилозин (tylosin), бетакаротен (betacarotene).

1.2 Лекарственная форма — суспензия для внутриматочного введения.

1.3 1 мл препарата содержит действующие вещества: 10 мг тилозина тартрата, 2 мг Р-каротина (в 0,1 мл масляного раствора); вспомогательные вещества: масло растительное фасовое или подсолнечное), пропиленгликоль и вода для инъекций или вода очищенная.

1.4 Препарат представляет собой суспензию от оранжевого до красноватокоричневого цвета со специфическим запахом; при хранении разделяется на 2 слоя, легко восстанавливается при взбалтывании.

1.5 Препарат упаковывают в пошмерные флаконы по 1000 мл.

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя в защищенном от света месте при температуре от 5 °C до 20 °C. Хранить в недоступном для детей месте!

1.7 Срок годности — 1 (одрш) год от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применять по истечении срока годности. Препарат уничтожают в соответствии с требованиями законодательства.

1.8 Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

2 Фармакологические свойства

2.1 Тилозинокар — комплексный противоэндометриальный препарат.

2.2 Тилозина тартрат, входящий в состав препарата, относится к антибиотикам группы макролидов; обладает широким спектром противомикробного действия, активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Trueperella* spp., *Clostridium* spp.), грамотрицательных микроорганизмов (*Pasteurella* spp.); а также *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp. и *Ureaplasma* spp.

2.3 Механизм действия тилозина тартрата, заключается в подавлении биосинтеза белка в микробной клетке, путем обратимого связывания с 50S-субъединицами рибосом. Тилозина тартрат накапливается в достаточно высокой концентрации в полостных органах организма животных, что способствует более эффективному этиотропному действию этого препарата при внутриматочном введении.

2.4 Бета- каротин обладает антиоксидантным действием, способствует нейтрализации свободных радикалов, активизирует восстановление сокращений миометрия у животных после родов, способствует сохранению специфичности клеток эпителия половых органов.

2.5 По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

3 Порядок применения

3.1 Тилозинокар применяют для лечения коров, больных эндометритом.

3.2 Перед введением препарата необходимо провести санитарную обработку наружа-гъж половых органов и корня хвоста животного. При необходимости освободить полость матки от экссудата. Флакон с препаратом необходимо подогреть до температуры 35-40 °с, тщательно взболтать содержимое флакона

3.3 Препарат вводят внутритратно с помощью шприца и пипетки для осеменения в дозе 2() мл на 100 кг массы тела с интервалом 48 часов до вьдоровлешая.

3.4 Противопоказания для применения: повышенная чувствительность животных к антибиотикам группы макролидов.

3.5 В случае возникновения аллергических реакций препарат следует отменить и назначить препараты кальция и антигистаминные препараты.

3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 7 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока может быть использовано в корм плотоядным животным.

3.7 Молоко, полученное от лактирующих коров, может применяться в пищевых целях через 48 часов после последнего введения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, можно использовать в корм животным после термической обработки.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными средствами.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, оформляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин», Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудником ООО «Белкаролин»
Перловым В.Е.