

ООО «Сталькон групп»
Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12
Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.
УНП 191672572 ОКПО 380175755000
IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск
тел./факс 8 (017) 514 11 10
моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44
e-mail: info@stalkon.by
<https://belmaster.by/>



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Сталькон групп»

С.Ф. Судникович

08.05.2020г.

Лосьон для рук косметический с антибактериальным эффектом "Клиосепт ультра"
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лосьон антибактериальный «Клиосепт Ультра» (далее по тексту – средство) представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом применяемой отдушки. В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт (2-пропанол) ($70,0 \pm 1,0\%$); хлоргексидин ($0,15 \pm 0,01\%$), ЧАС ($0,15 \pm 0,01\%$), увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки, а также технологические компоненты.

Средство изготовлено по ГОСТу 31679-2012.

Срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на сухие кисти рук и втирают в кожу до полного высыхания (20-30 сек.), обращая особое внимание на тщательность обработки околоногтевых лож и межпальцевых участков.

Обработка перчаток, одетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон). Время обработки не менее 30 сек. Экспозиция до полного высыхания перчаток.

Смывание средства не требуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только для наружного применения. Не принимать внутрь! Не наносить на раны и слизистые оболочки. Избегать попадания средства в глаза.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.