

УДК 613.95  
ББК 51.28  
Д33

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

Alla Koala, Vector Maker, KsanaGraphic, Helena-art, GoodStudio, Daria Doroshchuk,  
Natalia Zelenina, PinkPanda, FoxyImage, BNP Design Studio, V.A Gallery, Vectorbum,  
Buravleva stock, Saida\_ichi, Olga1818, Christina Li / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Д33      **Денисова, Татьяна Сергеевна.**  
              Спокойные родители, здоровый малыш : про сон, питание,  
              болезни и другие важные темы с позиции доказательной ме-  
              дицины / Татьяна Денисова. — Москва : Эксмо, 2023. — 288 с.

ISBN 978-5-04-160826-2

Как научиться получать удовольствие от родительства и при этом все правильно делать? Педиатр-аллерголог и мама двоих детей, блогер Татьяна Денисова делится с папами и мамами ключевыми знаниями по сохранению здоровья малыша и уходу за детьми первого года жизни. Она расскажет о том, что нужно сделать до родов, как обустроить спальню малыша и родителей, о чем правда надо волноваться, а что проходит самостоятельно. Какие диагнозы врачи ставят по привычке (но в международной классификации их попросту не существует), а какие действительно нужно лечить. Аллергия, питание, ортопедия и выбор первой обуви, страхи и гиперназначения — обо всем этом легко и интересно, с долей юмора и уважения.

УДК 613.95  
ББК 51.28

ISBN 978-5-04-160826-2

© Денисова Т.С., текст, 2023  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Научно-популярное издание

Денисова Татьяна Сергеевна

**СПОКОЙНЫЕ РОДИТЕЛИ, ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ  
ПРО СОН, ПИТАНИЕ, БОЛЕЗНИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ  
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ**

Главный редактор *P. Фасхутдинов*

Начальник отдела *T. Решетник*

Руководитель медицинского направления *O. Шестова*

Ответственный редактор *O. Ключникова*

Литературный редактор *E. Тимофеева*

Художественный редактор *B. Брагина*

Компьютерная верстка *E. Соболь*

Корректоры *E. Юрина, Ю. Дорогова*

Страна происхождения: Российская Федерация  
Шығарылған ел: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»  
123308, Россия, город Москва, улица Воронина, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.  
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Филиал: «ЭКСМО» АКБ Баспасы,  
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 гимарат, 20 кабет; оғис 2013 ж.  
Тел.: +7 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы»,  
Казахстан Республикасында импортаторша «РДЦ-Алматы» ЖШС.  
Дистрибутор и представитель по приему протезий на продукцию,  
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»  
Казахстан Республикасында дистрибутор және еним бойынша ариза-тапалтарды  
қабылдаудыңын екінші «РДЦ-Алматы» ЖШС,  
Алматы қ., Домбровский ауылы, 3-ағ, литер Б, оғис 1.  
Тел.: +7 (727) 251-59-90/91/92, E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарапайымлық мерзімі шектелмеген.

Сертификация түрлері: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)  
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ  
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:  
[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Дата изготовления / Подписано в печать 27.10.2022.

Формат 70x90<sup>1/16</sup>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0.

Тираж      экз. Заказ

12+

ПРИСОЕДИНИЯЙТЕСЬ К НАМ!



[eksmo.ru](http://eksmo.ru)

Мы в соцсетях:



[eksmo](#)



[eksmo.ru](#)

ЧИТАЙ·ГОРОД

ISBN 978-5-04-160826-2



9 785041 608262 >

В электронном виде книги издательства вы можете  
купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)

ЛитРес:  
один клик до книг



**book 24.ru**

Официальный  
интернет-магазин  
издательской группы  
«ЭКСМО-АСТ»

*Моим родителям. Вместо моей кандидатской. Папа, это писать было намного приятнее и уж точно полезней. Мама, спасибо, что ты всегда рядом.*



# Оглавление

От автора.....	9
Почему мне говорят другое? .....	11
<b>ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ .....</b>	<b>15</b>
1. Тем, у кого все только начинается .....	17
2. Физиологическая убыль.....	18
3. Желтуха новорожденных .....	20
4. Автокресло .....	22
5. Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ, SIDS).....	24
6. Почему ребенок плачет? Колики .....	27
7. Фиолетовый плач.....	31
8. Синдром «встряхнутого ребенка».....	33
9. Как успокоить плачущего младенца?.....	35
10. Кормление грудью .....	37
11. Диета кормящей мамы .....	41
12. Соска.....	43
13. Загадочное искусство постсоветской неврологии .....	45
14. Слинг — это безопасно?.....	47
<b>ПРО ЖИВОТ .....</b>	<b>51</b>
1. Стул младенца .....	53
2. Колики? Запор? Дисхезия!.....	55
3. Анализы кала на микропейзаж и копрограмму. Дисбактериоз .....	57
4. Пробиотики .....	59
5. Копрограмма.....	61
6. Анализ кала на углеводы. Лактазная недостаточность.....	62
7. Боли в животе.....	64

## Оглавление

---

8. Запоры .....	67
9. Самое важное про ОКИ .....	71
<b>ПРО КОЖУ .....</b>	<b>75</b>
1. «Это вы, мамочка, что-то съели!», или О сыпи у младенцев .....	77
2. Купание младенцев. Уход за пупком .....	79
3. Потница.....	80
4. Гемангиомы .....	82
5. Защита от солнца .....	84
6. Себорея, или «А у нас на голове корочки!».....	86
7. Атопический дерматит — это аллергия?.....	88
8. Эмоленты .....	90
9. Белый птириаз.....	92
10. Пилиарный кератоз.....	93
11. Сыпь от бассейна .....	94
12. Контагиозный моллюск .....	95
13. Асимметричная перифлексуральная экзантема — страшное название нестрашной болезни .....	97
14. Розовый лишай Жибера.....	98
15. Что делать, если покусали комары, москиты, муравьи или ужалила пчела, оса, шершень?.....	100
<b>КАШЕЛЬ, НАСМОРК, ТЕМПЕРАТУРА.....</b>	<b>103</b>
1. Мифы об ОРВИ .....	105
2. Когда надо идти к врачу? .....	108
3. В садик с насморком? .....	111
4. Что делать при ОРВИ?.....	113
5. Чего не делать при ОРВИ? .....	115
6. Кашель .....	116
7. Кому нужен небулайзер?.....	117
7. Бронхолитики .....	119
8. Ингаляционные гормоны .....	121
9. Сосудосуживающие капли.....	123
10. Про температуру.....	124
11. Нам стало хуже! .....	126
12. Ложный круп .....	128

## Оглавление

---

13. «У нас опустилось», или Острый бронхит .....	130
14. Затяжные сопли .....	132
15. Про закаливание.....	133
<b>ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ.....</b>	<b>137</b>
1. Мультисистемный воспалительный синдром.....	139
2. Настоящая ангина .....	140
3. Шестая детская болезнь — розеола.....	142
4. «Болезнь поцелуев» — инфекционный мононуклеоз.....	143
5. Болезнь «нога–рука–рот» .....	146
6. Коклюш .....	148
7. Корь.....	151
8. Ветряная оспа .....	155
9. А вдруг в садике ребенок с ВИЧ или гепатитом? .....	159
10. Паразиты.....	160
11. Острицы.....	162
12. Микроспория.....	163
12. Профилактика клещевых инфекций .....	165
14. Антибиотики .....	167
<b>АЛЛЕРГИЯ.....</b>	<b>171</b>
1. Аллергия или нет? .....	173
2. Про пищевую непереносимость .....	176
3. Высыпало щеки — это аллергия?.....	180
4. Аллергия в ЖКТ.....	183
5. Лактазная недостаточность и аллергия на белок коровьего молока .....	186
6. Сопли из-за еды? .....	188
7. Оральный аллергический синдром .....	189
8. Иммуноглобулин Е .....	192
9. Пикфлюметрия .....	193
<b>ПРО ПИТАНИЕ .....</b>	<b>197</b>
1. Про прикорм.....	199
2. Общие принципы введения прикорма, и что нельзя давать малышам?.....	201
3. Сколько можно сладкого?.....	203
4. Коровье молоко .....	205
5. Кофеин: друг или враг? .....	207

## Оглавление

---

6. Страсти по глютену .....	208
7. Где брать кальций, если нельзя молочные продукты? .....	210
8. Что можно пить и что не надо пить малышам? .....	212
9. Здоровое веганство .....	215
10. Козье молоко — страшная польза? .....	218
11. Суп — это полезно? .....	219
12. Алкоголь и ГВ .....	220
13. Какое масло выбрать? .....	221
13. Про грибы.....	224
<b>ВСЯКОЕ ПОЛЕЗНОЕ .....</b>	<b>227</b>
1. Купать или не купать?.....	229
2. Как не утонуть? .....	231
3. Про жаркую погоду .....	233
4. Ложные противопоказания для вакцинации .....	236
5. Обувь для малышей .....	239
6. Отравления .....	240
7. Укачивание .....	242
8. Про зубы .....	243
9. Темный налёт на зубах — налёт Пристли .....	246
10. Про прокалывание ушей .....	248
11. Синехии половых губ .....	250
12. Гигиена мальчиков.....	251
13. Икота.....	252
14. Скажем «нет» уколам.....	253
15. Когда нужно подозревать настоящий иммунодефицит? .....	254
16. Одышка .....	255
17. Натуральное равно безопасное? .....	257
18. Вред сотовых телефонов .....	262
19. Лимфоузлы .....	264
20. Сотрясение головного мозга.....	266
21. Поллакиурия.....	268
22. Чистота — залог здоровья? .....	270
23. Источники грамотной медицинской информации для пациентов.....	272
<b>Указатель .....</b>	<b>276</b>

# От автора

К рождению моего старшего ребенка у меня за плечами был медицинский вуз, два года ординатуры по педиатрии и 10 лет практики, большую часть которой составляли консультации именно маленьких детей. Мне казалось, что я знаю если не все, то почти все о том, как устроены младенцы и быт вокруг них. Казалось, что я уже абсолютно привыкла к детскому плачу и ничем меня не удивить. Чего я не знала, так это того, что привыкнуть можно к плачу чужих детей, но к реву собственного ребенка заранее подготовиться невозможно. Умножьте эту неожиданность на физическую усталость (предлагаю каждому походить с трехкилограммовой гантелью в руках весь день) и на недосып (малыши просыпаются поначалу каждые 2–3 часа и днем и ночью) — насладиться родительством становится совсем трудно. Но самое большое препятствие для наслаждения младенчиком — это наша родительская тревога.

Когда родился мой старший ребенок, первой мыслью было: «А вдруг с ним что-то случится?» (вторая мысль: «Будет жалко с ним толком не познакомиться...») — я в тот момент теряла сознание и думала, что умираю, но это уже потом).

Тревога за потомство — неотъемлемая часть родительства, эволюционный механизм, который позволил нам — человечеству — выжить: мы заботимся о своих малышах, добываем им пищу, отдаем лучшее, что у нас есть, тратим уйму энергии, чтобы дать им тепло и безопасность. В современном мире со всеми его благами эта же тревога толкает нас порой на крайность — хочется везде подстелить соломки: сдать побольше анализов, пройти побольше врачей, полечить на всякий случай...

## От автора

---

Цель этой книги — дать проверенную информацию, факты, знание которых поможет взвешенно принимать решения относительно здоровья вашего малыша, а значит, существенно снизить уровень тревоги.

Мне всегда жаль наблюдать, как из-за страхов и волнений родители не успевают насладиться первыми месяцами (а порой и годами) жизни своего ребенка. В бесконечных походах по врачам и за кипой анализов можно не заметить, как малыш тебе впервые улыбнулся и впервые встал на ножки. А если и заметишь, переживания: «А не рано ли? А не поздно ли?» и подобные — смажут краски эмоций.

Современные взрослые сталкиваются с младенцами вплотную, как правило, только заводя собственных детей. Это в былые времена, когда рожали пятерых и более, подростки нянчили малышей и хорошо понимали, что младенец — это не просто маленький человечек, у него много особенностей, сильно отличающих его от взрослого.

Кроме того, один на один мама и папа стали оставаться с младенцами только в последнее столетие. До этого семьи жили скопом, с малышами возились дети постарше и пожилые бабушки-дедушки, потому что работоспособные взрослые люди занимались другими делами. Умножьте непривычную необходимость оставаться тет-а-тет с младенчиком на требования общества интенсивно включаться в родительство («Вы еще не сделали массаж? Вы еще не ходите в бассейн? А мы уже цифры по карточкам изучаем!») и получите невыносимую усталость, истощение и желание никогда больше не повторять этот опыт. А если вам еще и темпераментный малыш достанется...

В этой книге я расскажу, на чем можно экономить энергию, что действительно важно и во что действительно стоит вложиться силами, временем, деньгами, а что не стоит вашего внимания.

Все, что здесь написано, — это «сборная солянка» рекомендаций авторитетных медицинских сообществ мира, таких как Американская академия педиатрии, Канадское и Австралийское педиатрические сообщества, Центр по контролю за заболеваемостью (CDC), Европейская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов и другие плюс опыт педиатра с двенадцатилетним стажем плюс бытовой опыт обычной работающей мамы двух детей.

# Почему мне говорят другое?

Вы можете услышать совсем другие рекомендации от знакомых, специалистов из поликлиники, от родителей на детской площадке. Почему так? Разве могут быть настолько разными ответы на одни и те же вопросы?

Секрет в нашей истории. До конца двадцатого столетия медицинские знания строились на опыте отдельно взятых специалистов: Парацельс, Авиценна, Гален, Боткин, Пирогов — они активно практиковали, записывали наблюдения, обобщали свой опыт и делились выводами с коллегами и учениками. С развитием математики и коммуникаций между странами стало понятно, что опыт одного специалиста ограничен и подвержен когнитивным искажениям. (Очень любопытная штука, подробнее можно узнать о них в лекциях Полины Шило «BIAS: механизмы нерациональных решений в медицине и повседневной жизни» на YouTube:



## Почему мне говорят другое?

---

И в книге «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана).



Это значит, что выводы, сделанные одним человеком, могут порой быть неверными, и гораздо надежнее опираться на совокупность рекомендаций, взятых из практики нескольких независимых друг от друга специалистов.

А еще надежнее результат будет, если анализ этой совокупности проводят не заинтересованные лица, а сторонние люди. А еще оказалось, что существует эффект плацебо: если пациент верит, что ему будет помогать лекарство, то оно будет помогать лучше (есть еще эффект «ноцебо»<sup>1</sup> — тоже занимательная штука, погуглите).

Так появилось понятие «двойное слепое плацебо-контролируемое мультицентровое рандомизированное исследование». Давайте расшифруем термин:

- ✓ плацебо-контролируемое означает, что сравнивают результаты в двух группах — в одной пациенты получают лекарство с действующим веществом, а в другой — «пустышку»;
- ✓ двойное слепое означает, что ни сам пациент, ни лечащий врач не знают, что получает пациент — «пустышку» или действующее вещество;
- ✓ мультицентровое — это когда исследования проводятся не в одном отделении и не одним исследователем, а в нескольких разных клиниках разными специалистами. Это снижает риски влияния личного стремления получить тот или иной результат в зависимости от предпочтений исследователя, а также избавляет от подтасовок;

---

<sup>1</sup> Ноцебо — от лат. «я поврежу» — средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную реакцию пациента (как антитеза плацебо). — Примеч. ред.

- ✓ рандомизированное значит, что в каждую из групп попадают случайно отобранные люди, перемешанные по полу, возрасту, финансовому положению, месту жительства и т. д.

Плюс по законам статистики результаты будут тем достовернее, чем больше испытуемых.

Конечно, такие исследования возможны не для каждого заболевания (например, бывают редкие болезни, когда набрать даже сотню испытуемых — очень трудная и долговременная задача), а еще они дороги (представьте, сколько человек нужно задействовать, чтобы набрать пациентов, поделить их на группы, наблюдать за ходом эксперимента, собрать и проанализировать результаты). Для того чтобы понимать степень надежности тех или иных рекомендаций, придумали пирамиду доказательств.



Все это помогает современному врачу выбирать варианты решений в той или иной клинической ситуации.

«А как же опыт?» — спросит читатель. Неужели врачебный опыт, набитая рука, насмотренные глаза уже не имеют значения?

Конечно имеют, ведь прежде чем предлагать решения, нужно понять, с чем мы имеем дело. Для этого необходим один из самых сложных и важных этапов лечебного процесса — дифференциальный диагноз.

Однако и тут есть ловушка. Существуют «традиционные диагнозы», назовем их так: полумифические болезни, теоретические основы которых не подтверждаются современными исследованиями. Сейчас приведу пример, и станет понятнее.

«Повышенное внутричерепное давление» — частая «страшилка» для родителей детей первого года жизни. Под этим термином понимают сочетание признаков — большой родничок, симптом Грефе (или заходящего

## **Почему мне говорят другое?**

---

солнца — полузакатившиеся глазки), беспокойный сон, плач, срыгивания и порой другие в зависимости от традиций в данном лечебном учреждении или медицинском вузе.


«Лечат» такое состояние мочегонными и ноотропными препаратами, а еще частенько массажем и электрофорезом.

При этом диагноз такой в международной классификации болезней отсутствует, перечисленные «симптомы» могут наблюдаться у абсолютно здоровых детей и проходят сами собой после 6–12 месяцев жизни; ноотропы не имеют доказанной эффективности и безопасности, а мочегонные при истинном нарушении оттока внутримозговой жидкости (ликвора) довольно бесполезны.

Но «диагноз» ставили десятки лет подряд и продолжают ставить по накатанной дорожке во многих учреждениях здравоохранения. Ведь доктора с многолетним опытом «всегда так работали, и помогало...». А как не помочь, если та часть пациентов, что была изначально здорова, просто перерастет эти «симптомы», а другая часть — с реальными проблемами — уйдет к другим специалистам, например к нейрохирургам? В итоге доктор живет в сладком неведении, считая, что делает все верно, и передает свои знания новым поколениям врачей.

Все это я рассказываю для того, чтобы подвести вас к мысли, что медицина — сложная и крайне динамичная наука, каждый день в ней происходят новые открытия. На одном опыте уже далеко не уедешь, необходимо постоянное обновление знаний. Отсюда рекомендация, одна из главных рекомендаций для родителей — отыскать доктора, который следит за медициной *real time*, который идет в ногу со временем. Такой специалист экономит родительские нервы, время и деньги.

# ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ





# 1. Тем, у кого все только начинается

Многое в родительстве станет сюрпризом, не все можно предусмотреть. Но есть вещи, о которых вы можете позаботиться заранее, пока у вас свободны руки и свежая голова.

Я искренне советую всем будущим родителям решить бытовые сложности до того, как появится малыш. Потому что если вы более-менее спокойно выносите скрип половицы или капающий кран, будучи выспавшейся и сытой, с младенцем на руках все эти мелочи будут откровенно бесить и забирать силы.

## ИТАК, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАРАНЕЕ?

Почитайте и посмотрите, как кормить малыша грудью и бутылочкой еще до родов.

Про кормление грудью многие красиво пишут, что это естественный процесс и все получится само собой, но не всегда бывает легко с первой попытки (подробнее см. раздел «Кормление грудью»). Грудное вскармливание — одно из самых полезных вложений в здоровье малыша. Найдите заранее контакты консультанта по ГВ на случай, если что-то пойдет не так.

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

- Почитайте авторитетную информацию на тему вакцинации ребенка. Некоторые прививки по календарю делают в первые дни жизни, дайте себе возможность принять спокойное и взвешенное решение (подробности можно узнать далее в нашей книге).
- Возьмите легкую еду в роддом (например, любимую шоколадку или батончик мюсли) — да, после родов очень хочется есть, а еду в больнице принесут по расписанию.
- Освойте детское автокресло — это одна из тех вещей, что надо купить заранее и потренироваться сажать туда большую куклу. А лучше взять на выписку кого-то из бывалых подружек.
- Не тратьте много денег на одежду для малыша первых месяцев жизни: она не успевает пригодиться, а растут дети очень быстро! Если очень хочется всего накупить, берите на вырост.
- Слинг или правильный эрго-рюкзак — крутая штука, чтобы освободить ваши руки (см. раздел «Слинг — это безопасно?»).
- Блэк-аут шторы, источник белого шума и видео-няня — must have, помогут обеспечить спокойный, более продолжительный сон и возможность выпить чашку кофе.
- До поездки в роддом заполните морозилку едой, которую легко разогреть.
- Не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь о ней просить родню и друзей.

## 2. Физиологическая убыль

Одна из самых частых «страшилок» в роддоме — убыль массы тела. Уверена: реки материнских слез пролиты по поводу этого состояния. Да-вайте разбираться, когда это опасно, а когда нет.

## 2. Физиологическая убыль

---

Здоровые доношенные новорожденные могут терять до 10 % массы тела при рождении в первые несколько дней жизни. Масса тела обычно восстанавливается к 10–14-му дню жизни. Рожденные путем кесарева сечения дети, находящиеся полностью на ГВ, могут терять в весе даже больше и возвращать массу тела медленнее.

Первая мера — более частое прикладывание к груди, если ребенок на ГВ. Докорм смесью рекомендуется, если убыль более 7 % от веса при рождении сохраняется между 5-м и 10-м днями жизни при наличии признаков обезвоживания, редкого стула (менее 3 эпизодов за сутки) и малого количества молока у матери. Допаивание раствором глюкозы или водой *не рекомендуется*.

Если мама планирует продолжать ГВ, помимо частого прикладывания может быть рекомендовано сцеживание до пустой груди. Многим мамам нелегко дается начало кормления грудью. Вот ресурсы, где можно получить адекватную информацию и поддержку, а также найти консультанта по ГВ.



Рекомендации по кормлению грудью в пандемию Covid-19 можно найти тут:



## 3. Желтуха новорожденных

Следует помнить, что нормальные уровни билирубина у новорожденных первых дней жизни сильно отличаются от норм для взрослого человека.

Самый частый вариант желтухи — **физиологическая**, — временное состояние. Такая желтуха обычно не требует лечения, появляется между 72-м и 96-м часами жизни.

Физиологическая желтуха новорожденных проходит к двум неделям жизни ребенка, более длительная желтуха — повод для обследования (у недоношенных детей сроки могут сдвигаться).

**Желтуха грудного вскармливания** появляется после 3–5-го дня жизни, пика достигает обычно ко 2-й неделе жизни и постепенно уменьшается к 3–12-й неделе. Чаще всего уровень билирубина при такой желтухе не достигает опасных значений, но требуется наблюдение. Если общий билирубин нарастает или конъюгированный составляет значимую часть, необходимо дополнительное обследование (прежде всего исключение непроходимости желчевыводящих путей).

Точная причина ЖГВ до сих пор неясна.

**Желтуха недостаточной лактации** чаще встречается на протяжении первой недели жизни, желтизна кожи в таком случае сочетается с плохой динамикой массы тела, признаками обезвоживания. Этот вариант связан с тем, что дефицит питания повышает риски желтухи у младенцев. Ос-

### **3. Желтуха новорожденных**

---

нова профилактики и лечения — частое прикладывание к груди с самого рождения.

## **КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ЖЕЛТУХУ?**

Если малыша выписали из роддома менее чем через 72 часа, то необходимо каждый день контролировать кожу и склеры на предмет желтухи. В течение 1–3 дней после выписки ребенок должен быть осмотрен врачом или медсестрой. Бывают и другие состояния, сопровождаемые желтухой у младенцев. Они требуют большего внимания и зачастую срьезного лечения.

Тяжелая желтуха может быть опасна для нервной системы. При уровне общего билирубина выше 240 мкМоль/л малышам старше 2 суток может потребоваться лечение.

#### **Признаки, требующие особого внимания:**

- желтуха в первые сутки жизни;
- нарастание уровня билирубина более чем на 3,4 мкМ/л в час;
- желтуха более 2 недель у доношенного ребенка;
- прямой (конъюгированный) билирубин выше 17мкМ/л при общем билирубине ниже 86 мкМ/л или прямой билирубин более 20 % от общего, если общий выше 86 мкМ/л (признак нарушения проходимости желчевыводящих путей).

#### **Свяжитесь с врачом, если при желтухе вы замечаете следующие признаки:**

- желтизна достигает уровня колен и ниже (кожа при желтухе прокрашивается от головы к стопам в зависимости от тяжести желтухи);
- ребенок плохо ест (вяло и/или редко);
- ребенка сложно разбудить;
- ребенок крайне беспокоен;
- ребенок изгибаются, запрокидывая голову назад.

## 4. Автокресло

Как-то раз я наблюдала ужасную картину: в дорогой большой машине ребенок 3–4 лет стоял на переднем сиденье, держась за приборную панель, смотря вдаль. За рулем был (по всей видимости) его папа, они весело смеялись.

Некоторые родители сетуют на то, что ребенок не любит сидеть в кресле и плачет. Друзья, тут у меня есть только очень резкие слова. Ведь выбор стоит между «ребенок плачет в поездке» и «ребенок больше не заплачет никогда»!

В США вас не выпишут из роддома без автокресла. Медсестра выходит вместе с родителями и проверяет, правильно ли вы разместили новорожденного, а одним из критериев для выписки недоношенного ребенка из больницы за рубежом является тест на способность сохранять адекватное кровоснабжение в автолюльке (оценивается по количеству кислорода в крови).

### ПОЧЕМУ АВТОКРЕСЛО — ЭТО ВАЖНО?

Пожалуйста, помните, что детские головы, шея, позвоночный столб гораздо более хрупкие, чем у взрослого человека.

Даже небольшого ДТП хватит, чтобы ребенок без автокресла получил непоправимые повреждения. Более того, ДТП может и вовсе не быть, достаточно резкого торможения — и уже могут быть серьезные

последствия: малыш может вылететь в лобовое стекло, переломать kostи и получить ушибы внутренних органов, получить тяжелую травму головного и спинного мозга.

Чуть позже мы поговорим про синдром «встряхнутого ребенка» (см. раздел «Синдром “встряхнутого ребенка”»). Даже такая сила — си-

## 4. Автокресло

ла тряски взрослого человека — может нанести смертельно опасные повреждения, что уж говорить о силе, которая развивается в машине на скорости?

Автокресло для детей до 2–3 лет должно размещаться спинкой вперед, то есть чтобы лицо малыша смотрело против движения. Объяснение кроется в особенностях анатомии и физиологии малышей — крупная голова на слабой шее.

В 2018 году Американская академия педиатрии обновила рекомендации: теперь в таком положении советуют располагать кресло максимально долго, насколько позволяет модель автокресла, а не только до двухлетнего возраста. Именно это положение максимально безопасно для ребенка. Многих родителей смущает «нефизиологичное» положение младенца в автокресле. Во-первых, находясь на родительских руках, малыши имеют скругленную спинку тоже, а во-вторых, дети — не дальnobойщики и вряд ли будут проводить в машине по несколько часов ежедневно. И даже если вам предстоит длительное автопутешествие, находиться в кресле для ребенка намного безопаснее, чем вне его.

При выборе автокресла есть рекомендация: лучше новое и недорогое, чем взятое из непроверенных рук. Дело в том, что если в автокресле есть повреждения (они могут быть не видны снаружи), то свою защитную функцию оно не сможет выполнить.

Если финансы позволяют выбирать, можно ознакомиться с краш-тестами (рейтингов много в сети). Но даже самое простое автокресло лучше, чем никакое.

Проверьте, плотно ли затянуты ремни, — между ремнем и грудкой ребенка должны с трудом проходить два пальца взрослого. Не помещайте ребенка в автокресло в объемной зимней одежде — оно будет плохо выполнять свою функцию в случае происшествия, а ребенок раннего возраста рискует задохнуться. (Да, поездка с малышом в холодное время года — то еще мероприятие!)

Пожалуйста, никогда не оставляйте детей в машине! Эту рекомендацию стоит соблюдать до того возраста, пока ребенок не станет достаточно сознательным, чтобы самостоятельно открыть дверь и выйти из авто. Обычно таким критерием считают школьный возраст.

Обратите внимание: популярные в постсоветском пространстве конверты на выписку не подходят для использования в автокресле. Ищите модели с перестегивающейся молнией или отдавайте предпочтение комбинезонам.

## 5. Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ, SIDS)

Многие мамы, выписываясь из роддома, все еще получают рекомендацию укладывать младенца спать на бочок, «чтобы не подавился, если срыгнет». Однако по итогам современных исследований установлено, что самое безопасное положение для сна здорового младенца — положение на спине. Почему это так — очень наглядно показывают схемы:



Именно положение на спине позволяет существенно снизить риски синдрома внезапной смерти. СВСМ (SIDS) — неожиданная смерть ре-

## 5. Синдром внезапной смерти младенцев


---

бенка без проблем со здоровьем первых 12 месяцев жизни. В 2015 году в США 1600 детей погибло из-за SIDS и 900 — из-за случайного удушения в кроватке. В России подобная статистика не ведется, поэтому точных цифр мы не знаем. Очень простые правила позволяют избежать этой трагедии. Запомните их и расскажите всем, кто остается наедине с младенцем:

- Кладите ребенка младше 12 месяцев спать на спинку.
- Сон на спине не повышает риски аспирации при срыгивании.
- Риски SIDS возрастают в 18 раз, если привыкшего спать на спине младенца внезапно положат спать на живот.
- SIDS чаще случается, когда ребенок находится не с родителями.
- Курение во время беременности и контакт младенца с табачным дымом повышает риск SIDS в несколько раз.
- Если ребенок, который умеет хорошо переворачиваться самостоятельно, во сне перевернулся на живот, нет необходимости егоозвращать на спину, но спать кладем на спину все равно.
- Пеленание необходимо прекращать после того, как ребенок начинает переворачиваться со спины на живот.
- Дети на ГВ реже погибают от SIDS, но совместный сон повышает риски.
- В детской кроватке не должно быть ничего, кроме плотного матраса, простыни, ребенка и его соски (если она нужна).
- Не вешайте соску на шею ребенку. Во время сна не используйте крепления для соски.
- Позиционеры для сна, ортопедические и другие подушки, бамперы, мягкие игрушки, одеяла повышают риски внезапной смерти, как и сон в родительской кровати или на диване.
- При перегреве риск синдрома внезапной смерти повышается.

В 1994 году в США началась кампания *Back to sleep* — родителям стали давать рекомендацию класть младенцев спать на спинку, и уже к 1999 году число случаев SIDS сократилось почти в два раза (см. график).

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ



Идеальный вариант организации сна для ребенка первого года жизни — кроватка без мягких объемных бортов, матрас четко по размеру кроватки и натяжная простыня на нем.

Особое внимание нужно уделять организации кроватки для малыша. Младенцу не обязательно уткнуться носом в подушку, чтобы задохнуться (хотя и это возможно, поэтому подушки не должно быть в кроватке). До

статочно, например, выдыхать воздух в «карман» из складок одеяла. Кроватка должна располагаться в той же комнате, что и постель ухаживающего за малышом взрослого. Никаких мягких игрушек, подушек, рюшечек и одеял. Если дома прохладно, то вместо одеяла лучше использовать специальную одежду для сна — детские спальные мешки, которые не должны быть слишком велики.

Важно понимать, что совместный сон менее безопасен для младенца, чем сон в отдельной кроватке, — риски SIDS при совместном сне выше.

Если же есть необходимость в одеяле, то оно не должно подниматься выше уровня локтя малыша, края одеяла стоит заправить под матрас, чтобы малыш ножками не смог закинуть его на себя.

Отдельно хочу сказать про совместный сон. Многие мамы выбирают этот путь, потому что, чего уж лукавить, хочется поспать, а не заниматься перекладыванием младенчика туда-сюда каждые два часа (если не чаще).

Если вы все же выбираете совместный сон, следующие правила помогут сделать эту практику более безопасной:

## 6. Почему ребенок плачет? Колики

- кровать лучше поставить к стене и располагать ребенка между стеной и вами;
- если партнер спит с вами, не укладывайте малыша между собой и партнером;
- откажитесь от объемных одеял и подушек;
- одеяло можно натягивать не выше пояса;
- не надевайте объемную и свободную одежду на время сна, используйте облегающие варианты;
- если у вас длинные волосы, соберите их в пучок;
- матрас на кровати должен быть плотным, используйте натяжную простыню;
- избавьтесь от лишних предметов в постели.

# 6. Почему ребенок плачет? Колики

Так много, как в первые три месяца, дети не плачут больше никогда в своей жизни.

Средняя продолжительность плача у младенцев в первые 6 недель после рождения 117–133 минуты в день, к 10–12-й неделе снижается до 69 минут в день, но эти значения могут сильно варьироваться.

Плохие новости: мы до конца не знаем, почему это происходит.  
Хорошие новости: мы точно знаем, что это проходит.

## ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КОЛИКИ?

Колики — плач без видимой причины более 3 часов в день и более 3 дней в неделю у здоровых в остальном детей младше 3 месяцев (кри-

## **ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ**

---

терии *Wessel*). Некоторые специалисты предпочитают другие термины: «плаксиво-беспокойное поведение», «чрезмерный плач», «период фиолетового плача».

Римские критерии 4-го пересмотра определяют колики как функциональное расстройство ЖКТ у детей первых пяти месяцев жизни, проявляющееся продолжительным и повторяющимся плачем, беспокойством, которые начинаются и заканчиваются без видимой причины и не могут быть предупреждены или купированы. При коликах не должно быть плохой прибавки в весе, лихорадки, болезненного общего вида ребенка. Длительности плача/беспокойства более 3 часов в день на протяжении 3 и более дней в неделю. Точная причина колик не установлена. Ученые обсуждают следующие возможные причины.

### **1. Гастроинтестинальные:**

- переедание/недоедание,
- заглатывание воздуха,
- непереносимость белка коровьего молока,
- непереносимость лактозы,
- незрелость ЖКТ (например, плохое всасывание углеводов),
- гипермобильность кишечника (обнаружены более высокие уровни вещества мотилина у детей с коликами),
- вариации кишечной микрофлоры.

**2. Биологические:** незрелая моторная регуляция, высокий уровень серотонина, колики как вариант мигрени.

**3. Психосоциальные:** особенности темперамента малыша, гиперчувствительность (крик как эмоциональная разрядка), уровень стресса в семье, материнская тревожность, трансляция напряжения от матери к младенцу.

### **Отличительные черты колик:**

- приступообразность — четкое начало и конец, нет связи начала с какими-либо факторами;

## 6. Почему ребенок плачет? Колики

- качество крика отличается от обычного плача: более громкий, вариабельный по тембру, похож на крик от боли;
- «гипертония» — покраснение лица, бледность области вокруг рта, напряженный или надутый живот, поджатые ноги, согнутые пальцы, напряженные руки, выгнутая спина;
- сложности в успокоении. Облегчение может сопровождаться отхождением газов или стула.

Обратите внимание на эти слова: «начинаются и заканчиваются без видимой причины и не могут быть предупреждены или купированы», плач «похож на крик от боли».

Конечно, такое беспокойное поведение малыша должно стать поводом для визита к врачу. Но будьте готовы к тому, что врач (исключив другие возможные причины и убедившись в том, что в остальном малыш хорошо себя чувствует) скажет вам, что это колики и самое эффективное средство от них — это время.

Ребенок при коликах плачет не потому, что родители что-то делают не так.

Колики пройдут к 3 месяцам без каких-либо лечебных мероприятий. Родителям необходимо периодически отдыхать от плачущего ребенка — позволять друг другу выйти из дома на время, просить родственников и друзей провести время с младенцем. Ощущение беспомощности — это нормально!

**Важно: не трясите ребенка!** Это может привести к непоправимым последствиям (см. раздел «Синдром “встряхнутого ребенка”»).

Пересмотрите технику и позу кормления, пробуйте кормить в более вертикальном положении, позволяя отрыгивать воздух регулярнее.

Крайне важно понять: колики не причиняют вреда ребенку ни в момент существования, ни впоследствии.

Неужели ничего нельзя сделать? Кое-что можно попробовать. Эффективность этих вмешательств не доказана, но они не требуют больших затрат и безопасны.

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

В некоторых случаях можно попробовать исключить белок коровьего молока и другие частые пищевые аллергены (см. «Аллергия в ЖКТ») из рациона матери или перевести ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, на глубокий гидролизат (это специальные лечебные смеси для питания, в которых белок расщеплен на очень маленькие фрагменты). Длительность такого эксперимента — 1 неделя, при отсутствии выраженного эффекта нужно вернуть прежний рацион.

**Важно!** Из всех пробиотиков доказанной эффективностью обладает только один штамм — L. reuteri DSM 17938. Использование его возможно, когда другие методы не приносят облегчения. Целесообразность профилактического приема этого пробиотика сомнительна.

Источник профессиональной медицинской информации Uptodate.com не рекомендует использование лактазы, сукрозы, симетикона, общего массажа, растительных и гомеопатических препаратов, методов остеопатии, хиропрактики, акупунктуры с целью коррекции колик. В ходе исследований эти методы не показали существенных результатов в облегчении колик<sup>2</sup>, однако некоторые родители находили те или иные из перечисленных практик полезными (но мы помним про эффект плацебо, не так ли?). Важно знать, что растительные и гомеопатические средства не всегда безопасны для детей. Часто они не ре-

гистрируются как лекарственные препараты, а это значит, что контроль за их составом более слабый. Независимые экспертизы показывают, что подобные средства иногда содержат незаявленные компоненты и микробные загрязнения, которые могут навредить малышам.

Обратите внимание: зарубежные источники не рекомендуют делать посевы кала и убивать каких-либо микробов в кишечнике при коликах.  
Подробнее о дисбактериозе мы поговорим в разделе «Анализ кала на микропейзаж и копрограмму. Дисбактериоз».

---

<sup>2</sup><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21729336/>

## 7. Фиолетовый плач

Плач собственного ребенка — один из самых сильных триггеров родительской тревоги. «Я что-то делаю не так!», «Наверное, он заболел...», «Я недостаточно стараюсь!..» Есть ли такие родители, кого не посещают такие мысли? (По крайней мере, с первенцем.)

В последние годы все большую популярность набирает теория «фиолетового плача». Знание этой теории помогает пережить столь непростой период крика ребенка наиболее безопасно и для малыша, и для его родителей.

Доктор Рональд Барр провел много наблюдений и исследований на тему плача у младенцев и обнаружил преинтереснейшие закономерности. Оказалось, что большинство малышей очень тихо ведут себя в первые две недели жизни, а затем начинают все больше и больше плакать с пиком в возрасте около 2 месяцев. Подобные закономерности обнаруживались у младенцев вне зависимости от их места жительства и социально-экономических обстоятельств. Более того, похожие тенденции в продолжительности плача исследователи обнаружили у животных (некоторых грызунов и обезьян), а еще недоношенные детки начинали больше плакать, доживая до возраста, когда им положено было родиться, плюс пару недель. Подробнее о теории можно узнать тут:

Не секрет, что до конца причины плача младенцев неясны по сей день. Лицо я уверена, что тот, кто сможет объяснить и решить эту проблему, обязательно получит Нобелевскую премию.



## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

Доктор Барр суммировал эти знания в теорию периода «фиолетового плача». Период «фиолетового плача» начинается в возрасте 2 недель и продолжается до 3–4 месяцев жизни. Называется он так не потому, что ребенок становится фиолетовым от продолжительного крика, а потому, что основные характеристики этого периода формируют акроним PURPLE:

**P — peak of crying — пик плача:**

ребенок может плакать все больше с каждой неделей с пиком в 2 месяца и спадом к третьему-пятому месяцу жизни;

**U — unexpected — неожиданный:**

плач начинается и проходит внезапно без видимой причины;

**R — resisting soothing — невозможно утешить:**

ребенок может не прекращать кричать, что бы вы ни делали;

**P — pain-like face — гримаса боли:**

плачущий ребенок выглядит так, будто ему больно;

**L — long lasting — длительный:**

плач может продолжаться 5 часов в сутки и даже более;

**E — evening — вечерний:**

ребенок может плакать преимущественно во второй половине дня.

Слово «период» означает, что плач не будет длиться вечно.

Все дети проходят через этот период, кто-то плачет больше, кто-то меньше (бывают же счастливчики, которым достались спокойные младенцы!).

Чтò бы ни случилось, не трясите ребенка! Тряска может привести к непоправимым последствиям: повреждениям головного мозга, серьезным нарушениям зрения и даже летальному исходу (так называемому синдрому «встряхнутого ребенка»; подробнее см. «Синдром “встряхнутого ребенка”»).

Зачастую этот плач невозмож но остановить. Ничего не помогает. Плач может длиться несколько часов подряд. Нужно учитывать, что подобный крик может быть связан с некоторыми заболеваниями у ребенка, поэтому при наличии других жалоб или сомнений у родителей, здоров ли их ребенок, необходим врачебный осмотр.

## 8. Синдром «встряхнутого ребенка»

Напрямую с проблемой детского плача связан так называемый синдром «встряхнутого ребенка» (СВР). Возникает он, когда взрослый трясет малыша. Чаще всего это случается оттого, что не удается успокоить его плач. Иногда тряска может быть элементом игры. Пожалуйста, избегайте таких маневров.

Лучше всего процессы, происходящие в теле ребенка, которого трясут, показывает видео:



### Сильная тряска может приводить к серьезным последствиям:

- параличи,
- нарушение зрения вплоть до полной слепоты,
- потеря слуха,
- задержка развития,
- эпилепсия и другие судорожные синдромы,
- смерть.

Случается СВР у детей до 5 лет, чаще всего с 2 до 4 месяцев жизни. В США число случаев СВР составляет примерно 600–1400 в год, точное количество указать сложно, так как травмы носят неспецифический характер. В России статистика не ведется.

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

Травмы при СВР обычно плохо заметны внешне, поэтому родителям бывает трудно понять, в чем причина плохого самочувствия ребенка. Врачам тоже бывает сложно распознать СВР, если родители не рассказывают об эпизодах тряски ребенка при опросе.

### **Возможные симптомы:**

- угнетение сознания,
- сонливость/раздражительность,
- судороги,
- расширение зрачков с отсутствием реакции на свет,
- снижение аппетита,
- рвота,
- запрокидывание головы в положении лежа,
- нарушение дыхания,
- остановка сердца.

## КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СВР?

Плач младенца действительно может вызывать очень негативные чувства, контролировать которые на фоне усталости крайне сложно. Пусть ваши ожидания о том, что такое родительство, будут реалистичными. Младенцы — это не только розовые или голубые рюшечки, улыбки и мими-ми... Это непростая работа 24 часа в сутки.

1. Сделайте глубокий вдох и посчитайте до 10.
2. Оставьте ребенка в безопасном месте и выйдите на некоторое время (10–15 минут) из комнаты, периодически возвращайтесь, проверяя состояние малыша.
3. Позвоните кому-либо для эмоциональной поддержки (родственникам, подруге и т. п.).
4. Покажите ребенка педиатру — плач может быть симптомом болезни, но будьте готовы к тому, что доктор скажет, что все хорошо, ребенок здоров.

## 9. Как успокоить плачущего младенца?

5. Помните: есть период «фиолетового плача» (см. раздел «Фиолетовый плач»), когда дети ревут без явной причины, — это нормально, и это обязательно пройдет!

6. Никогда не оставляйте ребенка с людьми, которым не можете полностью доверять.

7. Убедитесь, что всем людям, ухаживающим за ребенком, знакома эта информация.

Плач малыша не делает вас плохими родителями! Дети плачут, и это очень, очень грустно. Но вы точно делаете для них все, что в ваших силах. Обнимаю!

# 9. Как успокоить плачущего младенца?

Было дело: мой сын успокоился, только когда я примотала его в слинг, дала соску и вышла подпрыгивать с ним на холодный балкон (февраль месяц).

Уставать, расстраиваться, чувствовать себя неполноценным родителем и даже злиться — это *нормально*. Эти эмоции не делают вас плохим родителем, равно как не делает более хорошим родителем отсутствие этих эмоций.

Я советую всем будущим и недавно ставшим родителями распечатать эту шпаргалку и повесить на видном месте, так как в момент, когда эмоции зашкаливают, можно что-то забыть. Итак, если малыш рыдает, проверьте, все ли с ним хорошо. Малыш может плакать, если:

- он голоден,
- ему жарко/холодно,
- его подгузник мокрый/грязный,

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

- он хочет срыгнуть,
- он перевозбудился (много разных лиц, событий, запахов, эмоций и т. п.),
- ему скучно,
- он заболел,
- он переел.

Увы, иногда малыши плачут без понятного нам повода. Если все возможные причины беспокойства устраниены, попробуйте следующие способы:

- ✓ Предложите грудь, если ребенок на ГВ, или воды, если малыш на искусственном вскармливании.
- ✓ Запеленайте или заверните ребенка в тонкое одеялко.
- ✓ Поносите на руках, покачайтесь.
- ✓ Попробуйте искупать.
- ✓ Включите успокаивающие звуки (белый шум, запись биения сердца, фен, душ, пылесос и т. п.).
- ✓ Поносите в слинге или эрго-рюкзаке, подходящем малышу по возрасту.
- ✓ Предложите соску (информацию «за» и «против» соски читайте в разделе «Соска»).

**Помните:** самое главное — это безопасность. Если вы чувствуете, что негативные эмоции берут над вами верх (вам хочется потрясти ребенка: «Ну, что же ты еще от меня хочешь?!»), сделайте паузу.

1. Глубоко вдохните и посчитайте до 10.

Поместите ребенка в безопасное место (кроватка, манеж и т. п.) и выйдите из комнаты на 10–15 минут.

2. Сделайте что-то, что вас успокаивает: включите музыку, выполните простые домашние дела (помыть посуду и т. п.), позвоните близким для эмоциональной поддержки.

## 10. Кормление грудью

---

3. Проверяйте состояние малыша каждые 10–15 минут, если вам нужно больше времени, чтобы успокоиться.

4. После того как вы успокоитесь, попробуйте повторить меры для успокоения ребенка, которые мы обсудили.

Написанное выше — рекомендации Американской академии педиатрии. От себя добавлю: на видное место поместите листок с фразой, которая сможет вас остановить в случае эмоциональной бури, что-то вроде: «Он такой маленький и беззащитный, он не хочет тебя разозлить. Это обязательно пройдет».

# 10. Кормление грудью

Я абсолютно уверена, что кормление грудью — один из лучших вкладов в здоровье ребенка. Да, современные смеси позволяют детям расти и развиваться и не иметь существенных проблем, однако ни одному производителю не удалось полностью скопировать свойства грудного молока. Скажу больше: это вряд ли возможно, ведь в каждой паре мама-ребенок состав молока будет уникальным и отчасти варьировать день ото дня, обеспечивая адаптацию малыша к жизни вне материнской утробы.

Вокруг темы кормления грудью до сих пор очень много мифов, и самое неприятное, что много их и в головах медицинских работников. Давайте разбираться!

✗ В первые дни после родов нужно обязательно сцеживаться после каждого кормления; если молока в этот период мало, то нужно докармливать.

✓ На самом деле в первые дни после родов из груди выделяется молозиво и сцеживание не требуется почти никогда, оно может привести к гиперлактации, которая повышает риски дискомфорта и лактостаза<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Лактостаз — застой, задержка молока в выводных протоках молочной железы кормящей грудью женщины. — Примеч. ред.

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

у кормящей женщины. В случае если прибавка малыша в весе будут недостаточной, сцеживание может потребоваться.

✗ Если молоко «не пришло» в первые дни после родов, надо обязательно докармливать ребенка смесью.

✓ В первые дни после родов вырабатывается молозиво, его, действительно, мало, но это густая высококалорийная и очень питательная жидкость. Новорожденному в первые 2–3 суток этого количества как раз достаточно, ведь его желудок тоже очень мал по объему! Потеря небольшой части массы тела после рождения — нормальное явление (мы это уже обсуждали, см. раздел «Физиологическая убыль»), докорм смесью оправдан далеко не всегда.

✗ Если ребенка обсыпало, — это мама что-то не то съела.

✓ Чаще всего это несвязанные события. Видов сыпи у младенцев огромное количество — это и акне новорожденных, и милиа, и себорейный дерматит (подробнее см. раздел «Про кожу»). Иногда сыпь — нормальное проявление физиологии раннего возраста, иногда требуется лечение, но ситуации, когда причиной сыпи является питание мамы, достаточно редки.

✗ Если у ребенка болит живот, маме надо сдать молоко на стерильность.

✓ На самом деле посев молока имеет смысл только при наличии гнойного мастита у мамы, во всех остальных случаях это бесполезная затея.

Часто в посевах вырастает обычная (так называемая сапрофитная) флора, которая спокойно себе населяет выводные протоки желез и кожу. Попытки ее убить приводят к неоправданному приему антибиотиков, а ситуация с животом либо не меняется, либо сама собой разрешается с возрастом.

✗ Если маме сделали флюорографию, нужно сцеживаться, кормить нельзя несколько часов.

✓ На самом деле нет никаких доказательств пагубного влияния рентгеновских лучей на грудное молоко. Кормите себе спокойно и флюорографию, и рентгенографию делайте, если это необходимо.

## 10. Кормление грудью

---

✗ Если маме нужны антибиотики, антидепрессанты, другие лекарства, то грудное вскармливание нужно прервать.

✓ На самом деле во многих случаях можно подобрать препараты, совместимые с ГВ. Проверенные источники для оценки безопасности лекарств во время лактации:



✗ Если мама заболела ОРЗ, то кормить нельзя.

✓ На самом деле, продолжая грудное вскармливание, вы помогаете малышу поддерживать его защиту.

Если вы соблюдаете банальные гигиенические меры (моете руки, чихаете/кашляете в локоть или салфетку, не целуете малыша и т. п.), продолжение ГВ не сопряжено с какими-либо серьезными рисками.

✗ Если у ребенка кишечная инфекция, кормить грудью нельзя.

✓ На самом деле нет никаких доказательств, что продолжение ГВ в такой ситуации ухудшает течение болезни.

Наоборот — грудное молоко поможет восполнить потери жидкости у малыша при поносе и рвоте.

Но все же бывают ситуации, когда кормить малыша грудью нельзя!

✗ Галактоземия у ребенка.

✗ ВИЧ-инфекция у мамы.

✗ Т-клеточный лимфотропный вирус 1-го или 2-го типа у мамы.

✗ Мама использует «уличные» наркотики (термин «уличные» означает, что эти наркотические средства не были прописаны врачом и не были приобретены в аптеке).

✗ У мамы подозрение на вирус Эбола.

## **ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ**

---

По поводу ВИЧ-инфекции можно встретить противоречивую информацию. В ситуации, когда ВИЧ-положительная мама получает адекватную терапию, а малыш получает профилактическое лечение (это необходимо, так как вероятность заразиться в родах высока), риски грудного вскармливания невелики, но не исключены на 100 %. Большинство авторитетных медицинских сообществ сходится во мнении, что там, где доступны качественные адаптированные смеси и чистая вода, искусственное вскармливание в такой ситуации — более безопасный вариант для ребенка<sup>4</sup>.

### **Когда кормление нужно прекратить временно?**

- ✓ Бруцеллез у мамы.
- ✓ Употребление некоторых препаратов.
- ✓ Диагностические исследования или лечение мамы с использованием радиоактивных препаратов (это не рентгенологическое обследование!).
- ✓ Активные герпетические поражения на молочной железе у мамы.

У младенцев с очень низкой массой тела при рождении список противопоказаний чуть шире, в подобной ситуации нужно пообщаться с лечащим врачом малыша.

### **Когда можно кормить сцеженным молоком?**

- Активный туберкулез у мамы.
- Ветряная оспа у мамы.

### **Ложные противопоказания для кормления грудью:**

- ОРЗ у мамы;
- кишечная инфекция у мамы или у ребенка;
- прием антибиотиков мамой (есть антибиотики, совместимые с ГВ);
- рентгенография у мамы;
- резус-конфликт;
- высеяг стафилококка из молока мамы.

---

<sup>4</sup> <https://www.cdc.gov/hiv/group/gender/pregnantwomen/index.html>.

## 11. Диета кормящей мамы

Мама тоже человек, маме иногда бывает нужно отлучиться от малыша. В такой ситуации совершенно необязательно прибегать к помощи смеси, на помощь придет молокоотсос.

### Сколько можно хранить сцеженное молоко?

- При комнатной температуре (16–29 °C) — 4 часа.
- В термосе со льдом/в сумке-холодильнике (−15 +4 °C) — 24 часа.
- В холодильнике (4 °C) — 4 дня (держать у дальней стенки).
- В морозилке (общая дверца с холодильником) (−15 °C) — 2 недели.
- В морозилке (отдельная дверца) (−18 °C) — 3–6 месяцев.
- При глубокой заморозке (−20°) — 6–12 месяцев.

### Размороженное молоко можно хранить гораздо меньше:

- При комнатной температуре — 1–2 часа.
- В холодильнике — 24 часа.
- Повторно замораживать молоко нельзя.
- Если малыш не доел сцеженное в бутылочку молоко, можно его доесть в течение 2 часов.

Кипятить бутылочки и соски рекомендуется вплоть до возраста 12 месяцев. Полезными приобретениями могут стать пакеты для заморозки молока и для стерилизации в микроволновке.

# 11. Диета кормящей мамы

## НЕТ НИКАКОЙ ДИЕТЫ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ!

Да, именно с этого я бы хотела начать главу: универсальной диеты, рекомендованной для всех кормящих мам, не существует! Более того, пищевая аллергия у детей на ГВ — явление весьма редкое.

## ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

---

Иногда конкретная пища в рационе мамы может ухудшать самочувствие ребенка (чаще всего это молочные продукты), в таких случаях рекомендуется ограничить их употребление. При этом самочувствие ребенка должно стать существенно лучше в период диеты мамы и явно ухудшиться при попытках вернуть продукт в рацион. Таких ситуаций, когда маме нельзя ничего красного, желтого, оранжевого, рыбу, курицу, яйца, орехи и сладкое одновременно, не бывает.

Нет никаких оснований ограничивать рацион женщины только из-за того, что она кормит малыша грудным молоком.

Единственная рекомендация: ограничить потребление сортов рыбы, которые содержат большое количество ртути (марлин, акула, рыба-меч, кафельник, королевская ма-крель), — невелика потеря, как

мне кажется. Однако есть продукты, которые могут влиять на самочувствие детки и состояние лактации. Вот они.

✓ Молочные продукты у некоторых детей могут усиливать беспокойство. Если вы замечаете четкую связь, обсудите ситуацию с педиатром. Еще раз пишу большими буквами: *обсудите с педиатром*, а не исключайте молочку на всякий случай.

✓ Кофеин — некоторые младенцы очень к нему чувствительны: может нарушаться сон, усиливаться беспокойство. При обнаружении четкой связи уменьшите его количество (помните, что кофеин — это не только кофе? Смотрите соответствующую главу).

✓ Петрушка, мята, шалфей могут подавлять лактацию.

✓ Алкоголь проникает в грудное молоко, самое безопасное — не употреблять алкоголь во время ГВ совсем, подробнее см. раздел «Алкоголь и ГВ».

✓ Газообразующие продукты — различные виды капусты, бобовые, виноград и т. п. Если самочувствие ребенка явно ухудшается от них, ограничьте. Повторюсь: *на всякий случай исключать не надо!*

Чем разнообразнее питание мамы, тем лучше себя чувствует она сама, тем проще малышу

Нет никаких доказательств того, что скучный рацион кормящей женщины может защитить ребенка от аллергии, скорее всего, даже наоборот!

будет знакомиться с новыми продуктами в процессе прикорма, это подтверждено результатами исследований. Короче говоря, дорогие мамы, *ешьте вкусно, полезно и разнообразно!*

# 12. Соска

Использовать пустышку или нет — *решение за родителями!* С позиции стоматологов использование соски безопасно до 2–3 летнего возраста, однако рекомендуется ограничиться длительностью до 6 часов в сутки.

Пустышка иногда помогает успокоить ребенка, отвлечь его, облегчает засыпание, дискомфорт во время перелетов и болезненных процедур (например, забора крови или вакцинации).

Данные о преимуществах одних видов сосок перед другими противоречивы: есть мнение, что так называемые ортодонтические пустышки более физиологичны и с меньшей вероятностью будут влиять на формирование прикуса, но в последнем систематическом обзоре не подтверждена такая версия<sup>5</sup>. В некоторых исследованиях упоминается о снижении риска развития синдрома внезапной смерти младенцев при использовании соски.

Существует мнение, что раннее использование соски может нарушить грудное вскармливание (Американская академия педиатрии не рекомендует использовать соску до установления уверенной лактации, приблизительный срок, по мнению ААП, — 3–4 недели жизни<sup>6</sup>).

Считается, что от сосания пальца отучить труднее, чем от соски, — соску можно выбросить, а палец никуда не денешь.

<sup>5</sup> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30054865>.

<sup>6</sup> <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/pacifiers/art-20048140>.