

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Хондартрон®

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Хондартрон® (Chondartron®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Хондартрон® содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Apis mellifica Ø=D1 – 1 нл, Calcium fluoratum D4 trituration – 0,1 мкг, Causticum Hahnemanni D4 trituration – 1,0 мг, Ledum palustre Ø=D1 – 0,2 мкл, Lithium carbonicum Ø=D2 – 1 пл, Rhododendron Ø=D1 – 20 мкл, Rhus toxicodendron Ø – 4 мкл, Sulfur Ø=D4 – 100 мкл, Symphytum Ø – 9 мкл, Сабельника настойку – 40 нл и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоата натриевую соль, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Хондартрон® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Хондартрон® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Хондартрон® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

6. Хондартрон® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Хондартрон® относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам для ветеринарного применения.

10. Хондартрон® обладает противовоспалительным, обезболивающим, хондропротекторным действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Входящие в состав лекарственного препарата в сверхмалых концентрациях биологически активные вещества растительного, минерального и органического происхождения избирательно воздействуют на фиброзные ткани (фасции, связки, сухожилия) и хрящевую ткань, оказывая противовоспалительное и противоотечное действие, активируют обмен веществ и стимулируют репаративные процессы в костной и хрящевой ткани, улучшают выработку суставной жидкости, предотвращают разрушение хряща и деформацию сустава, ускоряют сращивание костных отломков и образование костной мозоли.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и sensibilizing действием.

III. Порядок применения

11. Хондартрон® назначают собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным для профилактики и лечения острых и хронических заболеваний суставов и околосуставных структур (бурсит, синовит, артрит, артроз); заболеваний и травм сухожильно-связочного аппарата (тендовагинит); для реабилитации после хирургических вмешательств на опорно-двигательном аппарате.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с Хондартроном® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Хондартрона® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения Хондартрона® самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. Хондартрон® применяют внутримышечно или подкожно в разовых дозах:

- собакам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного (но не менее 0,5 мл/животное);
- лошадям – 8,0-10,0 мл/животное;
- крупному рогатому скоту, свиньям – 5,0 мл/животное;
- телятам, пороссятам – 2,5 мл/животное.

В острых случаях заболевания препарат вводят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней, при подостром и хроническом течении болезни – 2-3 раза в неделю. Длительность курса лечения устанавливает ветеринарный врач, но она не должна превышать 1 месяца.

В целях профилактики заболеваний препарат вводят 1 раз в сутки в течение 14 дней, профилактический курс повторяют 2 раза в год.

16. При применении Хондартрона® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Применение Хондартрона® не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности.

В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукция животного происхождения во время и после применения Хондартрона® может быть использована без ограничений.