

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Гепатовет Актив»

I. Общие сведения

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: суспензия.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 мл содержатся действующие вещества: метионин – 100 мг, L-орнитин гх – 50 мг, экстракт расторопши сухой – 30 мг, экстракт бессмертника сухой – 15 мг; вспомогательные вещества: лецитин – 60 мг, калия сорбат – 1,5 мг, натрия бензоат – 1,5 мг, Na-карбоксиметилцеллюлоза – 4 мг, натрия метабисульфит – 2,5 мг, глицерин – 50 мг, полисорбат-80 – 6 мг, «Ароматизатор «Бекон» – 0,5 мг, «Аспасвит Ц 200» (подсластитель) – 2 мг, 20% эмульсия полидиметилсилоксана – 2 мг, вода очищенная до 1 мл.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 0,1-1,0 мг/мл, содержание метионина – 90,0-110,0 мг/мл, содержание орнитина – 45,0-55,0 мг/мл.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 мл, 50 мл и 100 мл во флаконы из полимерного материала, укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия или укупоренные пластиковыми адаптерами для шприца-дозатора и навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон снабжают шприцем-дозатором, инструкцией по применению и упаковывают в пачку из картона.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем во флаконе, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Описание внешнего вида кормовой добавки: суспензия коричневого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее после взбалтывания.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

2 года с даты производства, после вскрытия флакона – 21 сутки.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Гепатовет Актив» обусловлены входящими в состав биологически активными веществами, обеспечивающими антиоксидантную защиту клеток печени. Метионин предотвращает избыточное накопление жирорастворимых соединений в клетках печени, а также стимулирует быстрое выведение различных токсинов, включая тяжелые металлы, из клеток печени и почек. Орнитин регулирует цикл синтеза мочевины и снижает токсическое воздействие аммиака на организм животных. Растительные экстракты стимулируют восстановительные процессы, повышают защитные свойства клеток печени, ускоряют процессы секреции и выведения желчи.

Введение кормовой добавки в рационы животных улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, ускоряет регенерацию клеток печени.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для нормализации и улучшения работы печени у кошек и собак.

Показания для применения: нормализации и улучшение работы печени и желчного пузыря у собак и кошек. Может применяться для снижения возможного нежелательного токсического влияния некоторых лекарственных средств при их применении.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. У отдельных животных через 10-15 минут после применения отмечается гиперсаливация, которая самопроизвольно прекращается и не требует применения лекарственных средств для ветеринарного применения. При появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Масса животного	Разовая доза суспензии, мл	Суточная доза суспензии, мл
Собаки		
до 10 кг	1	2 – 3
10 – 20 кг	2	4 – 6
20 – 30 кг	3	6 – 9
30 – 40 кг	4	8 – 12
от 40 кг и более	5	10 – 15
Кошки		
до 3 кг	1	2 – 3
3 – 6 кг	2	4 – 6
от 6 кг и более	3	6 – 9

Способы применения: перорально, индивидуально с небольшим количеством корма или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2-3 раза в день.

Перед применением флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1-2 минут.

Продолжительность применения: в течение 3-5 недель.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.